



Activeer de kracht van uw huid

VERNIEUW DE STEVIGHEID VAN DE
HUID DANKZIJ DE GELEIDELIJKE EN
LANGDURIGE EFFECTEN VAN DE
ORIGINELE COLLAGESTIMULATOR



GALDERMA
EST. 1981

De reacties die in deze brochure worden beschreven, zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van een patiënt en vormen geen garantie voor de ervaring van anderen. Zoals geldt voor alle behandelingen met injecteerbare huidfillers, kunnen zich bijwerkingen voordoen als gevolg van de behandeling. De bijwerkingen zijn doorgaans licht tot matig van aard en betreffen voorbijgaande reacties zoals roodheid, pijn, zwelling, blauwe plekken en/of bultjes op de injectieplaats. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

Collageen

Vanaf een leeftijd van 45 jaar krijgt u te maken met een collageenverlies van 25%.¹

IS ESSENTIEEL

Waarom is collageen zo belangrijk voor de huid naarmate we ouder worden?


Collageen is een vezelachtig eiwit in de diepe dermis dat de huid structuur geeft en de functies van elastine en hyaluronzuur (HA) ondersteunt. Het helpt de vorm van de huid te behouden, en houdt deze zacht en gehydrateerd. Een gezonde aanmaak van collageen zorgt voor een jeugdiger uitstraling.



WAAROM

Sculptra?

Sculptra activeert het vermogen van de huid om collageen te produceren.²⁻⁶



DE ORIGINELE COLLAGEENSTIMULATOR

Vervangt de structuur die verloren is gegaan bij het ouder worden, om zo de stevigheid van de huid te verbeteren.²⁻⁶



HERSTELT DE HUID GELEIDELIJK

Vernieuwt de huid door het volume te herstellen en rimpels te verzachten.^{5,7-12}



BIEDT LANGDURIGE RESULTATEN

De resultaten houden tot ten minste 25 maanden na de laatste behandeling aan.^{5,7-12†}

† Klinische studie beëindigd na 25 maanden.

Huid die er jong

KATHERINE, 53 JAAR Behandeld met 3 flacons *Sculptra*.




VOOR



NA 18 WEKEN



NA 27 WEKEN



VAN DE GEBRUIKERS WAS
NOG STEEDS TEVREDEN OVER
DE RESULTATEN VAN HUN
BEHANDELING TOT TEN MINSTE
25 MAANDEN NA HUN LAATSTE
INJECTIE.^{13*†}

Echte patiënt. Individuele resultaten kunnen verschillen. | † gebruiker = proefpersoon

ong uitziet

BEGINT VAN BINNENUIT

Over uw *Sculptra*-behandeling

In de loop van de komende weken en maanden zal het product de collageenproductie stimuleren, wat de interne structuur van de huid verbetert en een jeugdige uitstraling creëert.

Wanneer zijn de resultaten zichtbaar?

We weten allemaal dat geduld een mooie zaak is. Wanneer het gaat om uw Sculptra-behandeling, worden de resultaten geleidelijk zichtbaar: dit betekent dat de veranderingen subtiel en meestal niet onmiddellijk na de eerste behandeling zichtbaar zijn. De verbeteringen houden lang aan, tot 25 maand na uw laatste behandeling. Regelmatige onderhoudssessies bij uw arts worden aanbevolen om de verbetering van uw huidstructuur aan te houden.

Zijn er bijwerkingen?

Uw arts heeft u geïnformeerd over de mogelijke risico's en bijwerkingen. Als u bijwerkingen ondervindt, neem dan contact op met hem of haar.

Nazorgtips?

Om een optimaal resultaat en een geleidelijk, langdurig effect van Sculptra te garanderen, is het belangrijk dat u de nazorginstructies van uw arts naleeft. Aanbevelingen voor nazorg zijn de volgende:

- Masseer de behandelde zone gedurende 5 minuten, 5 keer per dag gedurende 5 dagen na uw behandeling, volgens het advies van uw arts.
 - Gebruik een vochtinbrengende crème om de wrijving tijdens het masseren te verminderen.
- Breng in de eerste 24 uur na uw behandeling een ijskompres aan, gewikkeld in een handdoek (leg geen ijs rechtstreeks op uw huid) op de behandelde zone om de zwelling te verminderen.
- U mag enkele uren na uw Sculptra-behandeling make-up gebruiken als zich geen complicaties voordoen (bijvoorbeeld, open wonden of bloeding).
- Vermijd blootstelling aan de zon en UV-zonnebanklampen tot de zwelling en de roodheid verdwenen zijn.
- Vermijd sauna/stoombaden gedurende 24 uur.

Als u meer advies wenst of vragen hebt over uw behandeling, bespreek dit dan rechtstreeks met uw arts.

LANGDURIGE

resultaten

ELISSA, 49 JAAR Behandeld met 5 flacons *Sculptra*.



VOOR



45 DAGEN NA 2^{DE} SESSIE



25 MAANDEN NA DE BEHANDELING

*Geleidelijke
en langdurige
resultaten*

Echte patiënt. Individuele resultaten kunnen verschillen.

Resultaten die voor zich spreken

CARA, 42 JAAR Behandeld met 3 flacons *Sculptra*.



VOOR



NA 8 MAANDEN

“Sculptra heeft een enorm verschil gemaakt voor mij. Het geeft me zelfvertrouwen, en ik zie er 10 jaar jonger uit.”

STEWART, 54 JAAR Behandeld met 5 flacons *Sculptra*.



VOOR



NA 7 MAANDEN

“Ik ben zeer opgetogen over het toegenomen volume en de verbetering van mijn huidskleur. Ik voel me jonger en gezonder!”



De sleutel tot een stevigere huid



De meest voorkomende bijwerkingen na de eerste behandeling zijn onder meer zwelling van de injectieplaats, gevoeligheid, roodheid, pijn, kneuzing, bloeding, jeuk en knobbels.⁷²⁴

Referenties

1. Shuster S, Black MM, McVitie E. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Br J Dermatol. 1975;93:639-643. 2. Stein P et al. The biological basis for poly-L-lactic acid-induced augmentation. J Dermatol Sci 2015;78(1):26-33. 3. Goldberg D et al. Single-Arm Study for the Characterization of Human Tissue Response to Injectable Poly-L-Lactic Acid. Dermatol Surg 2013;39(6):915-22. 4. Vleggaar D et al. Composition and Mechanism of Action of Poly-L-Lactic Acid in Soft Tissue Augmentation. J Drugs Dermatol 2014;13 (4 suppl):s29-31. 5. Moyle GJ et al. A randomized open-label study of immediate versus delayed poly(lactic acid) injections for the cosmetic management of facial lipodystrophy in persons with HIV infection. HIV Med 2004;5(2):82-87. 6. Bohnert K et al. Randomized, Controlled, Multicentered, Double-Blind Investigation of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Improving Skin Quality. Plast Reconstr Surg 2019;127(4):1684-92. 7. Narins RS et al. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. J Am Acad Dermatol 2010;62(3):448-62. 8. Brandt FS et al. Investigator Global Evaluations of Efficacy of Injectable Poly-L-Lactic Acid Versus Human Collagen in the Correction of Nasolabial Fold Wrinkles. Aesthet Surg J 2011;31(5):521-8. 9. Nelson L and Stewart KJ. Psychological morbidity and facial volume in HIV lipodystrophy: Quantification of treatment outcome. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2012;65(4):439-47. 10. Mest DR and Humble G. Safety and Efficacy of Poly-L-lactic Acid Injections in Persons with HIV-Associated Lipodystrophy: The US Experience. Dermatol Surg 2006;32(11):1336-45. 11. Chen HH et al. Quantitative Assessment of the Longevity of Poly-L-Lactic Acid as a Volumizing Filler Using 3-Dimensional Photography. JAMA Facial Plast Surg 2015;17(1):39-43. 12. Valantin MA et al. Poly(lactic acid) implants (New-Fill) to correct facial lipodystrophy in HIV-infected patients: Results of the open-label study VEGA. AIDS 2003;17(17):2471-7. 13. Brown SA et al. Subject Global Evaluation and Subject Satisfaction Using Injectable Poly-L-Lactic Acid versus Human Collagen for the Correction of Nasolabial Fold Wrinkles. Plast Reconstr Surg 2011;127(4):1684-92. 14. Lowe NJ et al. Injectable poly-L-lactic acid: 3 years of aesthetic experience. Dermatol Surg 2009;35 Suppl 1:344-9.

Sculptra en Galderma zijn geregistreerde handelsmerken; MA-43504-01

Galderma Benelux B.V.
Postbus 9663
4801 LT Breda
Nederland

Tel. : +31 (0)183 69 1919
Fax : +31 (0)183 69 1918
info.nl@galderma.com
www.galdermabenelux.com

GALDERMA
EST. 1981